



ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA

Casos confirmados en la temporada 2019-2020. Datos provisionales.



DEGASER

A PARTIR DE 2 MESES DE EDAD




de dosis administradas



MILLONES

Vacunación frente a MenB de Reino Unido³



- Dimerid
- Hepatitis B


- Tosferina acelular
 - *Haemophilus influenzae* tipo b
 - Poliomelitis inactivada
 - Sarpión
 - Conjugado neumocócico heptavalente
 - Paperas
 - Rubéola
 - Varicela

APROBADO EN

A grayscale world map showing landmasses in light gray and oceans in white. A large, solid blue rectangle is positioned in the bottom-left quadrant of the map.

TOEFL

The image shows a decorative banner. It features a solid teal horizontal bar at the bottom. Above it is a white space with a thin teal curved line along the left edge. In the bottom-left corner, there is a small yellow triangle pointing upwards and to the right. The rest of the banner is white.



- Fiebre tifoidea (polisomática)
- Encefalitis japonesa

- Rabia

En **adolescentes** se puede administrar junto con:³

 - VPH (virus de papiloma humano) (tipos 6, 11, 16 y 18)
 - Tdap (tétanos, difteria reducida y tosferina acelular)

El impacto de la enfermedad invasiva en diferentes grupos de edad así como la epidemiología del meningitis grupo B en diferentes áreas geográficas debe tenerse en cuenta al vacunar. Ver sección 5.1 para información sobre protección frente a cepas específicas del grupo B. El uso de esta vacuna debe seguir las recomendaciones oficiales.²


Menveo está indicado para la inmunización activa de niños (a partir de los 2 años), adolescentes y adultos con riesgo de exposición a *Neisseria meningitidis* serogrupos A, C, W-135 e Y, con el fin de prevenir la infección por enfermedades invasivas. El uso de esta vacuna se debe realizar de acuerdo con las recomendaciones oficiales.⁴

FICHAS OFICIALES.

Referencias: 1. Instituto de Salud Carlos III. Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/Enfermedades/202020/IS_NI%20BA43_201031_WER_n.pdf. 2. Ficha técnica: Rayos X CS.

Centro de Información GSK
900 202 700

Para notificar una sospecha de reacción adversa contacte con GSK a través de <https://es.gsk.com/es-es/contacto/> o con el Sistema Español de Farmacovigilancia a través de www.notificaRAM.es.



es-ci@gsk.com

de farmacovigilancia a través de www.farmacovigilancia.es